

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, F. (2012). Efektivitas nematoda entomopatogen (*Steinernema spp.*) isolat lokal Kabupaten Hulu Sungai Utara terhadap pengendalian ulat grayak (*Spodoptera frugiperda*). Jurnal Sains Stiper Vol 2 No.2, Hal 47-52.
- Amanda, U. D. (2017). Pemanfaatan tanaman refugia untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman padi. Buletin informasi pengkajian dan diseminasi inovasi teknologi pertanian, 7(2), 29–45.
- Bakhri, S. (2007). Budidaya Jagung dengan Konsep Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Sulawesi tengah: Balai pengkajian teknologi pertanian (BPTP).
- Balai Penelitian Tanaman Sayuran. (2015). Empat Prinsip Dasar dalam Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Jakarta: Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Bateman, M. L., Day, R. K., Luke, B., Edgington, S., Kuhlmann, U., & Cock, M.J. W. (2018). Assessment of potential biopesticide options for managing fall armyworm (*Spodoptera frugiperda*) in Africa. *Journal of Applied Entomology*. 142(9), 805-819. <https://doi.org/10.1111/jen.12565>
- Basnet, K., & Mukhopadhyay, A. (2014). Biocontrol potential of the lynx spider *Oxyopes javanus* (Araneae: Oxyopidae) against the tea mosquito bug, *Helopeltis theivora* (Heteroptera: Miridae). *International Journal of Tropical Insect Science*, 34(4), 232-238.
- Baehaki, S. E. (2017). The Roles of predators suppress brown planthopper, *Nilaparvata lugens* Stal in the ricefields. *Sch J Agric Vet Sci*, 4(11), 452-460.
- Budiarti, L., Kartahadimaja, J., Sari, M. F., Ahyuni, D., & Dulbari. (2021). Keanekaragaman artropoda predator di agroekosistem sawah pada berbagai galur padi Politeknik Negeri Lampung. *Agroscript*, 31-47.
- Butt, A., & Xaaceph, M. (2015). Functional response of *Oxyopes javanus* (Araneidae: Oxyopidae) to *Sogatella furcifera* (Hemiptera: Delphacidae) in laboratory and mesocosm. *Pakistan Journal of Zoology*, 47(1).
- Bumroongsook, S., Name, J., & Kilaso, M. (2018). Consumption efficiency of wolf and lynx spiders, *Pardosa pseudoannulata* and *Oxyopes javanus*, on insect pests of Asiatic pennywort.

- Chimweta, M., Nyakudya, I. W., Jimu, L., & Bray Mashingaidze, A. (2019). Fall armyworm [*Spodoptera frugiperda* (J.E Smith)] damage in maize: management options for flood-recession cropping smallholder farmers. *International Journal of Pest Management*, 66(2), 142-154.
- Coblentz, K. E., & DeLong, J. P. (2021). Estimating predator functional responses using the times between prey captures. *Ecology*, 102(4), e03307.
- Curtsdotter, A., Banks, H. T., Banks, J. E., Jonsson, M., Jonsson, T., Laubmeier, A. N., & Bommarco, R. (2019). Ecosystem function in predator-prey food webs—confronting dynamic models with empirical data. *Journal of Animal Ecology*, 88(2), 196-210.
- Da Rocha, L., & Redaelli, L. R. (2004). Functional response of *Cosmoclopius nigroannulatus* (Hemiptera: Reduviidae) to different densities of *Spartocera dentiventris* (Hemiptera: Coreidae) nymphae. *Brazilian Journal of Biology Revista Brasileira de Biologia*, 64(2), 309-316.
- Djunaedy, A. (2009). Biopestisida sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman (OPT) yang ramah lingkungan. *Embryo*, 6(1): 88-95.
- Dirgayana, I. W., Supartha, I. W., & Wijaya, D. I. N. (2021). Uji pemangsaan dan tanggap fungsional predator *Chrysoperla carnea* Stephens (Neuroptera: Crysopidae) terhadap *Phenacoccus manihoti* Matile-Ferrero (Hemiptera: Pseudococcidae). *Agrotrop: Journal on Agriculture Science*, 11(1), 76-84.
- [FAO & CABI] Food and Agriculture Organization, CAB International. (2019). *Community-based fall armywarm (*Spodoptera frugiperda*) monitoring, early warning and management. Training of Trainers Manual*, First Edition. Rome (IT) and Wallingford (UK): Food and Agriculture Organization of the United Nations and CAB International.
- [FAO & CABI] Food and Agriculture Organization, CAB International. (2019). *Community-based fall armywarm (*Spodoptera frugiperda*) monitoring, early warning and management. Training of Trainers Manual*, First Edition. Rome (IT) and Wallingford (UK): Food and Agriculture Organization of the United Nations and CAB International.
- Finke, D. L., & Denno, R. F. (2005). Predator diversity and the functioning of ecosystems: the role of intraguild predation in dampening trophic cascades. *Ecology letters*, 8(12), 1299-1306.

- Finke, D. L., & Snyder, W. E. (2010). Conserving the benefits of predator biodiversity. *Biological Conservation*, 143(10), 2260-2269.
- Foelix, R. (2010). *Biology of spiders*. Oxford university press.
- Halarnkar, M. M., & Pai, I. K. (2018). Distribution, diversity and ecology of spider species at two different habitats.
- Holling, C. S. (1965). The functional response of predators to prey density and its role in mimicry and population regulation. *The Memoirs of the Entomological Society of Canada*, 97(S45), 5-60.
- Greenstone, M. H. (1979). Spider feeding behaviour optimises dietary essential amino acid composition. *Nature*, 282(5738), 501-503.
- Kurniawan, R. (2016). *Analisis regresi*. Prenada Media.
- Nasral, T. J., Syahrawati, M., & Liswarni, Y. (2020). Daya Predasi dan Tanggap Fungsional Kumbang Unta (*Ophionea nigrofasciata*) pada Beberapa Kepadatan Wereng Batang Coklat (*Nilaparvata lugens*): Predation Rate and Functional Response of Camel Groundbeetle (*Ophionea nigrofasciata*) on Several Densities of Brown Planthopper (*Nilaparvata lugens*). *Jurnal Proteksi Tanaman*, 4(1), 11-20.
- Nelly, N., Trizelia dan Q. Syuhadah. (2012). Tanggap fungsional menochilus *sexmaculatus fabricius* (Coleoptera: Coccinellidae) terhadap *Aphis gossypii* (Glover) (Homoptera: Aphididae) pada umur tanaman cabai berbeda. *Jurnal Entomologi Indonesia* 9 (1): 23-31.
- Nelly, N., Habazar, T., Syahni, R., Sahari, B., & Buchori, D. (2005). Tanggap fungsional parasitoid *Eriborus argenteopilosus* (Cameron) terhadap *Crocidolomia pavonana* (Fabricius) pada suhu yang berbeda. *Hayati Journal of Biosciences*, 12(1), 17-22.
- Nugroho, Andika Dwi. (2018). Komunitas laba-laba (Ordo: Araneae) permukaan tanah di hutan Sokokembang, Pekalongan, Jawa Tengah. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nurariaty. (2014). Pengendalian Hayati Hama dan Konservasi Musuh Alami. Bogor: IPB Press.
- Nurlaela. (2017). Keragaman jenis laba-laba (Arthropoda: Araneae) di Kelurahan Samata Kabupaten Gowa. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Nyffeler M, Sunderland KD. (2003). Composition, abundance and pest control potential of spider communities in agroecosystem: a comparison of European and US studies. *Agric Ecosyst Environ* 95: 576-612.

- Mubeen, M., & Basavarajappa, S. (2018). Density, abundance and per cent occurrence of spider species (Arachnida: Araneae) in and around Mysore city, Karnataka, India—a case study. *IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences*, 13(3), 31-40.
- Prasaja, G Y., Tris Haris R & Edy Syahputra (2014). Preferensi dan respons fungsional *Chelisoches morio* terhadap larva *Brontispa longissima* di laboratorium Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak. *J. Perkebunan & lahan tropika*, Vol.4(2).
- Ramakrishnaiah, T. N., Sreeramu, A., & Ramakrishna, S. (2018). Morphometric analysis of oxyopid spiders (Araneae: oxyopidae) from Karnataka. *Indian Journal of Entomology*, 80(2), 211-216.
- Rade, P. S. H. (2020). Biologi fall armyworm (*Spodoptera frugiferda* J. E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) di Laboratorium. Universitas Sumatera Utara. Skripsi.
- Rachmawati D. (2013). Karakteristik habitat dan keanekaragaman *Arachnida* family *Araneidae* di Cagar Alam Tukung Gede Serang Banten. Makalah dalam Proseding Semirata FMIPA Universitas Lampung, FMIPA Universitas Lampung. Lampung.
- Russianzi, R. (2021). Biostatistics of fall armyworm *Spodoptera frugiperda* in maize plants in Bogor, West Java, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, 22(6), 3463-3469.
- Rosida, N., Komalasari, E., & Fahmi, D. A. (2013). Uji Kemampuan Makan Beberapa Predator terhadap Wereng Hijau (*Nephrotettix virescens Distant*). In *Prosiding Seminar Nasional Agribisnis: Optimalisasi Sumberdaya dan Kearifan Lokal untuk Pengembangan Agribisnis dan Peningkatan Ketahanan Pangan* (pp. 863-866).
- Saldi. (2020). Toksisitas *beauveria bassiana* (bals.) vuil. Berbagai konsentrasi terhadap larva *Spodoptera frugiperda* Smith (Lepidoptera: Noctuidae) di Laboratorium. Skripsi hama dan penyakit tumbuhan program studi agroteknologi. Universitas Hasunuddin.
- Setyoko, Moch Argo. (2022). Biodiversitas laba-laba (Araneae) di Curug Indrokilo Kabupaten Semarang. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.
- Singh, R. (2021). Faunal diversity of Oxyopidae (Araneomorphae: Araneae: Arachnida) in India: an updated checklist. *Journal of Global Biosciences*.

- Schmitz, O. J., Grabowski, J. H., Peckarsky, B. L., Preisser, E. L., Trussell, G. C., & Vonesh, J. R. (2008). From individuals to ecosystem function: toward an integration of evolutionary and ecosystem ecology. *Ecology*, 89(9), 2436-2445.
- Sisay, B., Simiyu, J., Malusi, P., Likhayo, P., Mendesil, E., Elibariki, N., Wakgari, M., Ayalew, G., & Tefera, T. (2018). First report of the fall armyworm, *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera: Noctuidae), natural enemies from Africa. *Journal of Applied Entomology*, 142(8), 800-804. <https://doi.org/10.1111/jen.12534>
- Subekti, N. A., Syafruddin, R, Efendi dan S. Sunarti. (2013). Morfologi tanaman dan fase pertumbuhan jagung. Balai penelitian tanaman serealia, Marros. Hal 185-204
- Sumiati. (2018). Keragaman dan kelimpahan arthropoda pada beras di Gudang Bulog Cakranegara II dan Gudang Lembar Divre Nusa Tenggara Barat. Universitas Mataram.
- Sunarno. (2012). Pengendalian hayati (Biologi control) sebagai salah satu komponen. Pengendalian Hama Terpadu (PHT). *Jurnal Juniera*. 1:1–12.
- Susilo, H., Hakim, M.N., & Setiawan, U.. (2021). Biodiversitas laba-laba Arachnida (*Araneae*) di kawasan ekosistem Desa Wisata Banyubiru Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang. *Jurnalis*, 4 (1).
- Santoso, S., & Iswella, E. (2013). Preferensi dan tanggap fungsional *Neoseiulus californicus McGregor* (Acari: Phytoseiidae) sebagai predator *Tetranychus kanzawai Kishida* (Acari: Tetranychidae). *Jurnal Entomologi Indonesia*, 10(2), 78-78.
- Tampubolon, M.P. (2014). Prospek pengendalian penyakit parasitik dengan agen hayati. *JITV*, 19(3).
- USDA. (2019). Agricultural Total Factor Productivity Growth Indices for Individual Countries, 1961-2012.
- Windriyanti, W. (2004). Preferensi dan respon fungsional *Oxyopes javanus Thorell* sebagai pemangsa hama pengisap polong *Piezodorus hybneri Gmelin* (Heteroptera: Pentatomidae). Malang: Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN

| KODE | INSTAR | JUMLAH MANGSA | ULANGAN | | | TOTAL MANGSA TERMAKAN | TOTAL MANGSA TERSEDIA (N) | TOTAL MANGSA SISA | waktu pengamatan (jam) | DAYA PREDASI (EKOR/JAM) | Attack rate (a) : ekor | handling time (Th) : ekor/jam | TIPE TANGGAP |
|------|--------|---------------|---------|----|----|-----------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| I2-1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 14 | 15 | 1 | 24 | 0,58 | 3,9 | 1,7 | 0,577558 |
| I2-2 | | 10 | 8 | 6 | 7 | 21 | 30 | 9 | | 0,88 | 2,9 | 1,1 | 0,866337 |
| I2-3 | | 20 | 13 | 10 | 7 | 30 | 60 | 30 | | 1,25 | 2,1 | 0,8 | 1,237624 |
| I2-4 | | 40 | 23 | 30 | 26 | 79 | 120 | 41 | | 3,29 | 2,7 | 0,3 | 3,259076 |
| I2-5 | | 80 | 23 | 28 | 31 | 82 | 240 | 158 | | 3,42 | 1,4 | 0,3 | 3,382838 |
| I3-1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 24 | 0,63 | 4,2 | 1,6 | 0,618812 |
| I3-2 | | 10 | 8 | 6 | 6 | 20 | 30 | 10 | | 0,83 | 2,8 | 1,2 | 0,825083 |
| I3-3 | | 20 | 10 | 11 | 10 | 31 | 60 | 29 | | 1,29 | 2,2 | 0,8 | 1,278878 |
| I3-4 | | 40 | 23 | 19 | 21 | 63 | 120 | 57 | | 2,63 | 2,2 | 0,4 | 2,59901 |
| I3-5 | | 80 | 24 | 20 | 23 | 67 | 240 | 173 | | 2,79 | 1,2 | 0,4 | 2,764026 |