

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dilakukan memiliki kesimpulan bahwa:

1. Kombinasi dosis pupuk guano dan POC urin kelinci memberikan interaksi yang nyata terhadap jumlah daun pada umur 35 HST, berat buah per buah, berat buah per hektar, serta kadar gula. Kombinasi dosis terbaik ditemukan pada perlakuan pupuk guano 450 g/tanaman dan POC urin kelinci 200 ml/tanaman.
2. Perlakuan dosis pupuk guano secara tunggal memberikan pengaruh nyata terhadap panjang tanaman pada umur 28–35 HST, jumlah daun pada umur 28 HST, umur berbunga bunga betina, serta diameter buah. Perlakuan dengan dosis pupuk guano 450 g/tanaman menunjukkan hasil terbaik, meskipun tidak berbeda nyata dibandingkan dengan dosis 150 dan 300 g/tanaman.
3. Perlakuan dosis POC urin kelinci secara tunggal tidak memberikan pengaruh nyata pada seluruh parameter yang diamati.

5.2. Saran

Penulis menyarankan pemberian perlakuan pupuk guano dilakukan di awal tanam dengan cara dicampurkan dengan media tanam, penggunaan pupuk NPK juga diperlukan dan diberikan sesuai dosis anjuran yakni sebanyak 10 g/tanaman yang diberikan sebanyak 4 kali selama masa tanam, penambahan interval pemberian POC urin kelinci hingga 10 kali pemberian dan media tanam harus diberikan hingga memenuhi polybag.